

ВЕНЕРИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Перечень венерических заболеваний короткий и исчерпывающий. Гонорея (триппер), мягкий шанкр и сифилис. Других венерических заболеваний, которые распространены в наши дни, в то время не было, были неизвестны, на них не обращали внимания или их не считали венерическими заболеваниями. Распространение болезней среди проституток было поголовным, и первое заболевание они получали уже в самом начале «карьеры».

ТРИППЕР

Триппер был самым распространенным венерическим заболеванием. Врач-венеролог доктор Юдделович писал: «Триппер – это воспаление слизистой органа мочеиспускания, которое начинается через одно посещение (контакт) женщины, зараженной этой болезнью. Другие проявления этого заболевания медицинской науке неизвестны, ни состояние опьянения при половом контакте, ни испуг при возлежании не могут породить триппер. По-детски плутовские высказывания заболевших о том, что они подхватили триппер, неосторожно мочась против ветра, уже исчезают, так что врач во время приема таких речей не так уж много слышит».

МЯГКИЙ ШАНКР

На мужском половом органе в течение 2 – 5 дней после заражения появляется зуд и покраснение. На следующий день на месте внедрения бактерии появляется красное пятно, в центре которого возникает волдырь, при разрыве волдыря появляется гнойная рана, которая превращается в язвочку. Края язвы мягкие, что и дало заболеванию название и отличает его от твердого шанкра. При появлении темного и зловонного гноя болезнь становится особенно заразной, и может оставить на половых органах большие раны.

Обычно считалось, что эта болезнь не нуждается в специальном лечении, необходимо лишь улучшить образ жизни и, как и в случае с гонореей, воздерживаться от выпивки, правильно питаться и одеваться теплее.

СИФИЛИС

Сифилис или «злая болезнь», «нехорошая болезнь», твердый шанкр или «французская болезнь».

Сначала возникает небольшой нарост, который вскоре начинает гноиться. Гноя выделяется мало, боли нет, края раны твердые, отсюда появилось название «твердый шанкр». Примерно через шесть недель появляются пятна и прыщи по всему телу, выпадают волосы, появляются боли во всем теле, общая слабость, глазные заболевания. На этой стадии болезни человек становится очень заразным. В какой-то момент признаки заболевания проходят сами собой, однако появляются вновь через несколько месяцев, два-три года или более длительный период времени. При плохом лечении болезнь переходит в третью стадию. На коже и во внутренних органах появляются сифилитические гуммы (участки распада тканей и органов), которые начинают гноиться. Боли становятся постоянными, кости начинают крошиться, особенно нос может отвалиться. Проваливается и верхнее небо, поэтому больной(ая) часто говорит в нос, и пища во время её приёма попадает в нос. Некоторые больные слепнут. На третьей стадии сифилис уже не заразен.